

SCHERICUR® Pomada

Hidrocortisona

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de pomada contienen 250 mg de hidrocortisona.

Excipientes: cera blanca, lanolina, parafina sólida, parafina líquida, anfocerina KS, esencia de Chipre 6466, agua purificada.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Schericur se presenta en forma de pomada en envases de 30 g.

ACTIVIDAD

La hidrocortisona es un corticoide con acción antipruriginosa dermatológica.

TITULAR Y RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN**Titular de la autorización de comercialización:**

Intendis Derma, S.L.

Avda. Baix Llobregat, 3 - 5

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - España

Responsable de la fabricación:

Intendis Manufacturing S.p.A.

Vía E. Schering, 21

20090 Segrate (Milán) – Italia

Representante local:

Química Farmacéutica Bayer, S.L.

Avda. Baix Llobregat, 3 - 5

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - España

INDICACIONES

Alivio temporal sintomático del picor de la piel (pero no del dolor), debido a pequeñas irritaciones de la misma, alergia por contacto con jabones, detergentes, metales, picaduras de insectos y ortigas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a los componentes del producto.

No debe usarse en caso de irritación o escocedura.

No lo utilice sobre piel infectada, ni sobre heridas, acné, pie de atleta o úlceras de encamados.

No debe aplicarse en el interior de la zona anal ni genital.

PRECAUCIONES

No debe aplicarse ningún tipo de vendaje en la zona tratada, salvo que el médico lo indique.

Evite el contacto con ojos y mucosas, y lávase bien las manos después de su uso.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Este producto es solamente para uso externo.

Si los síntomas persisten durante más de siete días, o en caso de agravamiento, interrumpa el tratamiento y consulte al médico.

- **Embarazo y lactancia**

Los posibles efectos nocivos de Schericur durante el embarazo y la lactancia no se han estudiado, por lo que, al igual que con todos los medicamentos, antes de emplear Schericur en estas circunstancias deberán valorarse cuidadosamente los posibles riesgos frente a los beneficios esperados.

En estos casos, no utilice este medicamento sin consultar al médico.

- **Uso en niños**

Consultar al médico para utilizar el producto en niños menores de 12 años.

- **Uso en ancianos**

Dosificación igual que en adultos.

- **Efectos sobre la capacidad de conducción y manejo de maquinaria**

No son de esperar debido al tipo de producto y a la forma de administración.

- **Otras advertencias**

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede dar positivos en los análisis de dopaje.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO

Observe cuidadosamente estas instrucciones, o las que le haya dado su médico, ya que en caso contrario Schericur podría no ejercer el efecto deseado.

- Vía tópica dermatológica
- Adultos y niños mayores de 12 años: extender sobre la zona afectada una pequeña cantidad 1 o 2 veces al día.
- Niños menores de 12 años: consultar al médico.

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO

En caso de ingestión accidental, acuda a un centro médico, o consulte con el Servicio de Información Toxicológica, indicando el producto y cantidad aproximada ingerida.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.
Teléfono 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones alérgicas a la hidrocortisona.

Su uso prolongado, o en áreas extensas, puede producir absorción a través de la piel con hinchazón de cara y cuello.

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier reacción adversa que observe, en especial si no figura entre las citadas anteriormente.

CONSERVACIÓN

Schericur no debe conservarse a temperatura superior a los 30°C.

CADUCIDAD

La fecha de caducidad de este medicamento está impresa en el envase. ¡No utilice el medicamento después de esta fecha en ningún caso!

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO

Julio de 2005.

P-Schericur pomada-2.0a.doc